


Les gants au bon moment !

Résultats du quizz régional Filières MCO SSR SLD



E. Renouard Sariviere
ARLIN Languedoc Roussillon
Remerciements Cécile Mourlan



Mission mains propres 2016
« L'hygiène des mains, c'est tout le temps »



Contexte



Campagne Mission Mains Propres

- Défi proposé aux établissements de la région LR
« **Les gants au bon moment !** »
- Quizz sur le port des gants sur la population soignante/technique des ES et EMS
 - En référence au quizz de 2010 du CCLIN Sud-Ouest

Campagne Mission Mains Propres

- Mise à disposition d'un outil **Excel** élaboré par l'ARLIN pour la saisie des réponses avec:
 - ✓ tableaux de résultats
 - ✓ graphiques automatiquement remplis
- Exploitation en interne des résultats en identifiant les situations les moins conformes

Semaine du 9 au 13 mai 2016

- Invitation à s'inscrire sur le site du ministère de la santé en qualité de suiveur de notre défi.

L'hygiène des mains, c'est tout le temps

- 9 mai : Thème 1 « l'hygiène de mes mains, mon geste santé quotidien »
- 10 mai : Thème 2 « Je me désinfecte les mains, je vous protège »
- 11 mai : Thème 3 « Désinfection des mains : mieux informé, bien protégé »
- 12 mai : Thème 4 « Les gants au bon moment »
- 13 mai : Thème 5 « L'hygiène des mains, parlons-en »

Questions / réponses



Quizz « Gants » CCLINSO Journée mains mai 2016
Etes-vous un expert du port des gants ?



Votre catégorie professionnelle :

Infirmier/IADE/BODE
 Sage Femme/Puer.

A. Soignants/A. Puer
 ASH

Médecin/pharmacien
 Etudiants

Autres : préciser

Les situations suivantes vous paraissent-elles adaptées?

1 Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants.

Adapté Non adapté

2 Un kinésithérapeute aide un patient à expectorer avec des gants, les retire, réalise une friction des mains, puis lui prend son pouls.

Adapté Non adapté

3 Une IDE réalise sans gants de protection et avec un tablier la toilette corporelle (visage et thorax) d'un patient porteur d'une BMR.

Adapté Non adapté

4 Le port systématique des gants lors des soins permet de limiter le risque d'épidémie.

Adapté Non adapté

5 Un soignant essuie sans gants une surface souillée par du sang.

Adapté Non adapté

6 Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants.

Adapté Non adapté

7 Un manipulateur radio réalise avec des gants un acte auprès d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact ».

Adapté Non adapté

8 Une aide-soignante réalise la toilette intime d'un patient avec des gants.

Adapté Non adapté

9 Une IDE pose un cathéter sous-cutané sans gants.

Adapté Non adapté

10 Un aide soignant dépose avec des gants le plateau repas d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact ».

Adapté Non adapté



Quizz « Gants » CCLIN SO Journée mains mai 2016
Etes-vous un expert du port des gants ?
Réponses



1 **Non adapté**
 Il est recommandé de retirer les gants dès la fin de chaque soin ou geste à risque d'exposition aux liquides biologiques avant de réaliser un nouveau soin ou de toucher l'environnement.

2 **Adapté**
 Le port des gants est indiqué dès qu'il y a un risque de contact avec un liquide biologique. Le port des gants ne dispense pas d'une hygiène des mains.

3 **Adapté**
 Le port des gants n'est pas indiqué en cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR de type SARM.

4 **Non adapté**
 Les gants se contaminent au cours des soins et peuvent constituer un vecteur de transmission pour les micro-organismes.

5 **Non adapté**
 Le port des gants est indiqué dès qu'il y a un risque de contact avec un liquide biologique.

6 **Non adapté**
 Dans une séquence de soins à risque d'exposition ou de contact avec un liquide biologique pour un même patient, une nouvelle paire de gants doit être portée pour chacun de ces soins afin de maîtriser le risque de transmission de micro-organismes d'un site à l'autre.

7 **Non adapté**
 Le port des gants n'est pas indiqué en cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR de type SARM.

8 **Adapté**
 Le port des gants est indiqué avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée.

9 **Non adapté**
 Le port des gants est indiqué avant tout soin exposant à un risque de piqûre.

10 **Non adapté**
 Quel que soit le statut infectieux d'un patient, le port systématique des gants n'est pas recommandé avant de toucher l'environnement du patient.

Votre score (nombre de bonnes réponses) : /10

Avez vous 10 bonnes réponses : vous méritez le **Gant d'Or**, le port des gants n'a aucun secret pour vous !

Avez vous 8 ou 9 bonnes réponses : vous méritez le **Gant d'Argent** : Encore un petit effort, le port des gants n'aura bientôt plus de secret pour vous !

Avez vous 6 ou 7 bonnes réponses : vous méritez le **Gant de Bronze** : demandez un coup de main à votre équipe d'hygiène et à votre correspondant pour aider à lever la part de mystère qui persiste !


Avez vous moins de 6 bonnes réponses : vous recevez le **Gant de Boîte** : sollicitez d'urgence votre équipe opérationnelle d'hygiène et votre correspondant pour donner du punch à vos pratiques !

Participation


- 33 équipes opérationnelles, couvrant 42 établissements, ont relevé le défi et réalisé cet audit, parmi eux 4 ES hors région Languedoc Roussillon.
- Au total 2242 professionnels ont répondu à notre questionnaire.

Participation

FONCTION DES PARTICIPANTS N =2242



SPÉCIALITÉS PARTICIPANTES N= 2242



Les résultats MCO SSR SLD



Point positif

1

Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants.


Adapté

Non adapté

Vidange Poche à urine en série



MCO: Vidange Poche à urine en série



SSR SLD : 05% 95%

■ Non Adapté ■ Adapté

Non adapté



Il est recommandé de retirer les gants dès la fin de chaque soin ou geste à risque d'exposition aux liquides biologiques avant de réaliser un nouveau soin ou de toucher l'environnement.

Point positif


2

Un kinésithérapeute aide un patient à expectorer avec des gants, les retire, réalise une friction des mains, puis lui prend son pouls.

Adapté

Non adapté


Soins kiné



« Se protéger »

Utilisation des gants dans le but de protéger le professionnel

MCO Soins Kiné



SSR SLD : 11% 89%

Non Adapté Adapté



Adapté

Le port des gants est indiqué dès qu'il y a un risque de contact avec un liquide biologique. Le port des gants ne dispense pas d'une hygiène des mains.

Point positif

5


Un soignant essuie sans gants une surface souillée par du sang.

Adapté

Non adapté

« Se protéger »
Utilisation des gants dans le but de protéger le professionnel


MCO : Essuyage sans gant surface souillée de sang



SSR SLD : 01% 99%

■ Non Adapté ■ Adapté

Essuyage sans gant surface souillée de sang



Non adapté

Le port des gants est indiqué dès qu'il y a un risque de contact avec un liquide biologique.

Point positif


6

Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants.

Adapté

Non adapté


MCO : Pose KT et pansement



SSR SLD : 19% 81%

■ Non Adapté ■ Adapté

Pose KT et pansement



Non adapté

Dans une séquence de soins à risque d'exposition ou de contact avec un liquide biologique, pour un même patient, une nouvelle paire de gants doit être portée pour chacun de ces soins afin de maîtriser le risque de transmission de micro-organismes d'un site à l'autre.

Point positif


8

Une aide-soignante réalise la toilette intime d'un patient avec des gants.

Adapté

Non adapté


MCO : Toilette intime avec gant



SSR SLD : 04% 96%

Non Adapté Adapté

Toilette intime avec gant



Adapté

Le port des gants est indiqué avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée.


Point positif

9

Une IDE pose un cathéter sous-cutané sans gants.

Adapté Non adapté

MCO Pose KT sans gant



SSR SLD : 15% 85%

■ Non Adapté ■ Adapté

Pose KT sans gant



Non adapté

Le port des gants est indiqué avant tout soin exposant à un risque de piqûre.

A améliorer

« PEC des PATIENTS BMR »

3

Une IDE réalise sans gants de protection et avec un tablier la toilette corporelle (visage et thorax) d'un patient porteur d'une BMR.




Adapté




Non adapté

Toilette corporelle patient BMR



MCO : Toilette corporelle patient BMR



SSR SLD: 82% 18%

■ Non Adapté ■ Adapté



Adapté

Le port des gants n'est pas indiqué en cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR de type SARM

A améliorer

« PEC des PATIENTS BMR »

4

Le port systématique des gants lors des soins permet de limiter le risque d'épidémie.




Adapté



Non adapté


MCO : Port de gant limite épidémie



SSR SLD : 57% 43%

■ Non Adapté ■ Adapté

Port de gant limite épidémie



Non adapté

Les gants se contaminent au cours des soins et peuvent constituer un vecteur de transmission pour les micro-organismes.

A améliorer

« PEC des PATIENTS BMR »


7

Un manipulateur radio réalise avec des gants un acte auprès d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact ».

Adapté

Non adapté


MCO : Manipulateur radio patient BMR



SSR SLD : **77%** **23%**

■ Non Adapté ■ Adapté

Manipulateur radio patient BMR



Non adapté

Le port des gants n'est pas indiqué en cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR de type SARM.

A améliorer


10

Un aide soignant dépose avec des gants le plateau repas d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact».

Adapté

Non adapté


MCO : Plateau repas patient BMR



SSR SLD : 50% 50%

■ Non Adapté ■ Adapté

Plateau repas patient BMR



Non adapté

Quel que soit le statut infectieux d'un patient, le port systématique des gants n'est pas recommandé avant de toucher l'environnement du patient.

Recommandations nationales

Prévention de la transmission
croisée : précautions
complémentaires contact

Consensus formalisé d'experts

Avril 2009



3.2.2.2 PORT DE GANTS

R94: Il est recommandé de ne pas mettre systématiquement des gants de soins non stériles

- en entrant dans la chambre, (AF)
- avant de pratiquer un soin sur peau saine, (AF)
- avant de toucher l'environnement proche, (AM)

d'un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact.

Cette recommandation ne prend pas en compte la problématique de la prise en charge de certains microorganismes comme *Clostridium difficile* toxinogènes, entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG)... tel qu'indiqué dans le périmètre de ces recommandations.



Fiche mémo : mesures à appliquer pour un résident porteur de BMR/BHRe

TOILETTE, PRÉVENTION D'ESCARRE, RÉFECTION DU LIT ET LINGE DU RÉSIDENT

RÉSIDENT

- linge de toilette changé après chaque toilette ;
- savon personnel ;
- pansement : clos et propre, sinon réfection.

PERSONNEL

- tablier plastique à usage unique ;
- gants à usage unique non stériles seulement si contact avec liquides biologiques, muqueuses (toilette génitale), linge souillé ou si peau lésée ; friction hydro-alcoolique au retrait ;
- masque et lunettes à proximité du patient qui tousse ;
- lavage simple des mains si utilisation de produits pour la prévention d'escarre ;
- friction hydro-alcoolique sur mains sèches : avant le soin, après retrait des équipements de protection, avant de sortir de la chambre.

KIT BMR/BHRe POUR LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

Établissements d'Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes,
Foyers d'Accueil Médicalisés et Maisons d'Accueil Spécialisées,
Instituts Médico-Educatifs ...

Avril 2015

Les lauréats



Félicitations à l'hôpital de Béziers qui a gagné ce défi avec 240 participants.

suivi de près par le CH de Narbonne !!!



Remerciements

A l'ensemble des établissements et des professionnels qui ont participé au défi !!!

