### Journée Réseau des référents IAS en EMS




## Les gants au bon moment!

# Résultats du quizz régional en EHPAD



Evelyne Boudot
ARLIN Languedoc Roussillon
Remerciements Cécile Mourlan







Mission mains propres 2016 « L'hygiène des mains, c'est tout le temps »

## Contexte

### Campagne Mission Mains Propres

### L'hygiène des mains, c'est tout le temps

- 9 mai : Thème 1 « l'hygiène de mes mains, mon geste santé quotidien »
- •10 mai : Thème 2 « Je me désinfecte les mains, je vous protège »
- •11 mai : Thème 3 « Désinfection des mains : mieux informé, bien protégé »
- 12 mai : Thème 4 « Les gants au bon moment »
- •13 mai : Thème 5 « L'hygiène des mains, parlons-en »



### Campagne Mission Mains Propres

Défi proposé aux établissements de la région

« Les gants au bon moment! »

- •Quizz sur le port des gants sur la population soignante/technique des établissements ES et EHPAD
  - En référence au quizz de 2010 du CCLIN Sud-Ouest



#### Quizz « Gants » CCLINSO Journée mains mai 2016

#### Etes-vous un expert du port des gants?



		Votre catégorie pro	fessio	essionnelle :		ARlin Languedoc Roussillon		
	Infirmier/IADE/IBODE Sage Femme/Puer.	A.Soignants/A.Puer ASH		Médecin/pharmacien Etudiants		Autres : préciser		
Les situations suivantes vous paraissent-elles adaptées?								
	Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants.			Un kinésithérapeute aide un patient à expectorer avec des gants, les retire, réalise une friction des mains, puis lui prend son pouls.				
	Adapté	Non adapté		Adapté	0	Non adapté		
3								
	Une IDE réalise sans gants de protection et avec un tablier la toilette corporelle (visage et thorax) d'un patient porteur d'une BMR.			Le port systématique de	ematique des gants lors des soins miter le risque d'épidémie.			
	☐ Adapté	Non adapté		Adapté	0	Non adapté		
5								
	Un soignant essuie sans gants une surface souillée par du sang.			Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants.				
	Adapté	Non adapté		☐ Adapté	0	Non adapté		
7								
	Un manipulateur radio réal un acte auprès d'un patient bénéficiant de précautions	porteur d'un SARM		Une aide-soignante réal intime d'un patient avec				
	Adapté	Non adapté		☐ Adapté	0	Non adapté		
	Une IDE pose un cathéter s sans gants.	ous-cutané		Un aide soignant dépos plateau repas d'un patiel bénéficiant de précautic	nt port	eur d'un SARM		
	Adapté	Non adapté		Adapté		Non adapté		

### Questions

### Campagne Mission Mains Propres

- •Mise à disposition :
  - Grille de questions et de son corrigé
  - Outil Excel élaboré par l'ARLIN pour la saisie des réponses avec
    - tableaux de résultats
    - graphiques automatiquement remplis.
- Exploitation en interne des résultats en identifiant les situations les moins conformes
  - Distribution du corrigé



### Réponses



#### Etes-vous un expert du port des gants ? Réponses



1

## **€**3

#### Non adapté

Il est recommandé de retirer les gants dès la fin de chaque soin ou geste à risque d'exposition aux liquides biologiques avant de réaliser un nouveau soin ou de toucher l'environnement. 2



#### Adapté

Le port des gants estindiqué dès qu'il y a risque de contact avec un liquide biologique. Le port des gants ne dispense pas d'une hygiène des mains.





#### Adapté

Le port des gants n'est pas indiqué en cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR de type SARM.



#### Non adapté

Les gants se contaminent au cours des soins et peuvent constituer un vecteur de transmission pour les micro-organismes.





#### Non adapté

Le port des gants estindiqué dès qu'il y a risque de contact avec un liquide biologique.



#### Non adapté

Dans une séquence de soins à risque d'exposition ou de contact avec un liquide biologique, pour un même patient, une nouvelle paire de gants doit être portée pour chacun de ces soins afin de maîtriser le risque de transmission de micro-organismes d'un site à l'autre.





#### Non adapté

Le port des gants n'est pas indiqué en cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR de type SARM.



#### Adapté

Le port des gants est indiqué avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée.





#### Non adapté

Le port des gants est indiqué avant tout soin exposant à un risque de piqure.



#### Non adapté

Quel que soit le statut infectieux d'un patient, le port systématique des gants n'est pas recommandé avant de toucher l'environnement du patient.

Votre score (nombre de bonnes réponses) :

/10

Vous avez 10 bonnes réponses : vous méritez le Gant d'Or, le port des gants n'a aucun secret pour vous !
Vous avez 8 ou 9 bonnes réponses : vous méritez le Gant d'Argent: Encore un petit effort, le port des gants n'aura bientôt

Vous avez 6 ou 7 bonnes réponses : vous méritez le Gant de Bronze : demandez un coup de main à votre équipe d'hygiène et à votre correspondant pour aider à lever la part de mystère qui persiste !

Vous avez moins de 6 bonnes réponses : vous recevez le Gant de Boxe : sollicitez d'urgence votre équipe opérationnelle d'hygiène et votre correspondant pour donner du punch à vos pratiques !

### Semaine du 9 au 13 mai 2016

- Réalisation de l'enquête
- Invitation à s'inscrire sur le site du ministère de la santé en qualité de suiveur de notre défi.


### L'hygiène des mains, c'est tout le temps

- 9 mai : Thème 1 « l'hygiène de mes mains, mon geste santé quotidien »
- 10 mai : Thème 2 « Je me désinfecte les mains, je vous protège
- •11 mai : Thème 3 « Désinfection des mains : mieux informé, bien protégé »
- 12 mai : Thème 4 « Les gants au bon moment »
- -13 mai : Thème 5 « L'hygiène des mains, parlons-en »



## Participation

	EHPAD
Infirmier-IADE-IBODE	19
Sagefemme-Puericultrice	0
Aide soignant - Aux.puer	59
ASH	43
Médecin/pharmacien	0
Étudiant	8
Autres	7
Toutes catégories	136




Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants

BR: non adapté



Retrait des gants dès la fin de chaque soin



Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants

Un kiné aide un résident à expectorer avec des gants, les retire, réalise une friction des mains, puis lui prend son pouls


BR: non adapté




BR: adapté



Retrait des gants dès la fin de chaque soin



Port de gant indiqué dès qu'il y a risque de contact avec un liquide biologique



Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants

Un kiné aide un résident à expectorer avec des gants, les retire, réalise une friction des mains, puis lui prend son pouls

Un soignant essuie sans gants une surface souillée par du sang

BR: non adapté




BR: adapté




BR: non adapté




Retrait des gants dès la fin de chaque soin



Port de gant indiqué dès qu'il y a risque de contact avec un liquide biologique



Port de gant indiqué dès qu'il y a risque de contact avec un liquide biologique




Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants

BR: non adapté



Port d'une nouvelle paire de gants à chaque soin dans une séquence afin de maîtriser le risque de transmission de MO d'un site à l'autre



Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants

Une aide soignante réalise la toilette intime d'un patient avec des gants


BR: non adapté




BR: adapté



Port d'une nouvelle paire de gants à chaque soin dans une séquence afin de maîtriser le risque de transmission de MO d'un site à l'autre



Port de gant indiqué avant tout soin exposant à un risque de contact avec des muqueuses ou la peau lésée



"Se protéger »

Utilisation des gants dans le but de protéger le professionnel

Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants

Une aide soignante réalise la toilette intime d'un patient avec des gants

Une infirmière pose un cathéter sous cutané sans gants

BR: non adapté




BR: adapté




BR: non adapté



Port d'une nouvelle paire de gants à chaque soin dans une séquence afin de maîtriser le risque de transmission de MO d'un site à l'autre



Port de gant indiqué avant tout soin exposant à un risque de contact avec des muqueuses ou la peau lésée



Port de gant indiqué avant tout soin exposant à un risque de piqûre




Une IDE réalise sans gants de protection et avec un tablier la toilette corporelle (visage et thorax) d'un patient porteur d'une BMR

BR : adapté



Pas de port de gants indiqué dans le cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR



Une IDE réalise sans gants de protection et avec un tablier la toilette corporelle (visage et thorax) d'un patient porteur d'une BMR

Le port systématique des gants lors des soins permet de limiter le risque d'épidémie


BR: adapté




BR: non adapté



Pas de port de gants indiqué dans le cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR



Contamination des gants au cours des soins et possible vecteur de transmission pour les micro organismes




Un manipulateur radio réalise avec des gants un acte auprès d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact »

BR : non adapté



Pas de port de gants indiqué dans le cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR





Un manipulateur radio réalise avec des gants un acte auprès d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact »

Un aide soignant dépose avec des gants le plateau repas d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact »


BR: non adapté




BR: non adapté




Pas de port de gants indiqué dans le cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR



Port systématique de gants non recommandé avant de toucher l'environnement du patient quel que soit son statut infectieux





#### 3.2.2.2 PORT DE GANTS

R94: Il est recommandé de ne pas mettre systématiquement des gants de soins non stériles

- en entrant dans la chambre, (AF)
- avant de pratiquer un soin sur peau saine, (AF)
- avant de toucher l'environnement proche, (AM)
   d'un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact.

Cette recommandation ne prend pas en compte la problématique de la prise en charge de certains microorganismes comme *Clostridium difficile* toxinogènes, entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG)... tel qu'indiqué dans le périmètre de ces recommandations.



## Fiche mémo : mesures à appliquer pour un résident porteur de BMR/BHRe

#### TOILETTE, PRÉVENTION D'ESCARRE, RÉFECTION DU LIT ET LINGE DU RÉSIDENT

#### RÉSIDENT

- linge de toilette changé après chaque toilette;
- savon personnel;
- pansement : clos et propre, sinon réfection.

#### PERSONNEL

- tablier plastique à usage unique;
- gants à usage unique non stériles seulement si contact avec liquides biologiques, muqueuses (toilette génitale), linge souillé ou si peau lésée; friction hydro-alcoolique au retrait;
- masque et lunettes à proximité du patient qui tousse ;
- lavage simple des mains si utilisation de produits pour la prévention d'escarre;
- friction hydro-alcoolique sur mains sèches : avant le soin, après retrait des équipements de protection, avant de sortir de la chambre.

### Remerciements

A l'ensemble des EHPAD qui ont participé au défi « gants »

