

EN CAS DE PROBLEME
CONTACTEZ LE SERVICE :



**Antenne Régionale de
Lutte contre les
Infections Nosocomiales**

Hôpital Purpan
Pavillon Administratif Annexe II
Place du Dr Baylac - TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9
05.61.77.20.20



**VOUS ÊTES PORTEUR
D'UN PICC**

DE QUOI S'AGIT-IL ?

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS
POSSIBLES APRES LA POSE ?

QUELLES SONT LES PRECAUTIONS À PRENDRE ?


DE QUOI S'AGIT-IL ?

C'est un cathéter (tuyau fin et souple) introduit dans une grosse veine de l'organisme jusqu'à l'entrée du cœur. Il est inséré au niveau du bras. A son extrémité se trouve un système de raccord pour les perfusions. Ce dispositif peut également servir à d'autres injections ou à des prélèvements pour analyses dans le cadre de la surveillance de votre traitement.

Ainsi, grâce à ce dispositif, les veines superficielles de vos bras et de vos mains sont préservées. Il peut être laissé en place plusieurs mois.

Lors de votre sortie, une fiche de liaison ainsi que des fiches de surveillance, vous ont été remises à l'intention des professionnels qui vous prendront en charge à votre domicile. Pour votre sécurité, n'oubliez pas de transmettre ces documents lors de chaque soin et à chaque hospitalisation, ceci est important pour comprendre tout événement imprévu.

Pour comprendre : schéma d'un PICC



QUELLES SONT LES COMPLICATIONS POSSIBLES APRÈS LA POSE ?

Tout acte médical, même réalisé avec compétence peut donner lieu à des complications. Elles sont toujours rares, et transitoires.

- ◆ **L'infection du cathéter peut parfois obliger à l'enlever**, si les antibiotiques ne sont pas suffisamment efficaces. La prévention de l'infection repose sur des règles d'asepsie rigoureuses lors de toute manipulation.
- ◆ **La thrombose** : le dispositif n'est plus perméable du fait de la constitution d'un caillot de sang dans la veine, ce qui peut conduire à la prescription d'un traitement anticoagulant, voire à l'ablation du cathéter.
- ◆ **La rupture, ou la désinsertion du cathéter** sont exceptionnelles.

Ainsi, il est important de confier les soins infirmiers et la surveillance à des personnels formés à ces manipulations. Le dispositif pourra dans ces conditions être gardé pendant toute la durée de votre traitement, jusqu'à plusieurs mois, après quoi il pourra être enlevé très simplement.

Si un gonflement, une douleur, une rougeur, un écoulement au niveau du cathéter, une fièvre et /ou des frissons ou une gêne respiratoire apparaissent, consultez

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?

- ◆ Restez calme dans les heures suivant l'injection.
- ◆ L'hygiène corporelle quotidienne est importante. Réalisez une toilette ou une douche, les bains sont interdits. Utilisez de préférence un savon liquide, et une serviette et un gant de toilette propres à chaque fois. Ne mouillez pas le pansement : protégez-le par un film plastique de type alimentaire.
- ◆ Portez des vêtements à manches larges.
- ◆ Evitez de toucher le pansement ; si vous devez le toucher, lavez-vous les mains, ou frictionnez-les avec un produit hydro-alcoolique.
- ◆ Si le pansement se décolle, avertissez les infirmiers.
- ◆ Surveillez l'état de votre peau.
- ◆ Conservez vos habitudes de vie : travail, sport... Evitez cependant les chocs violents répétés comme fendre du bois, les mouvements répétitifs de type musculation, les sports violents comme le rugby.
- ◆ Evitez le port de charges lourdes.
- ◆ Portez toujours avec vous le carnet ou la carte de porteur de PICC et signalez tout choc dans cette région au médecin.