

Questionnaire Chirurgien

Enquête sur les procédures en chirurgie de la cataracte

Recueil anonyme

Suite à l'investigation de plusieurs signalements d'endophtalmie post-cataracte, les CPias IdF et Occitanie mènent une enquête sous forme d'un court questionnaire.

L'équipe des CPias vous remercie pour votre participation.

Statut de l'établissement :

Public Privé Espic

Type d'établissement :

CHU CH MCO

Région :

Occitanie Ile-de-France

Nom de l'établissement :

Ville :

Q1 : Quel(s) antiseptique(s) utilisez-vous pour la désinfection de l'œil ?

(plusieurs réponses possibles)

- Bétadine® 5%, solution pour irrigation oculaire, unidose
- Povidone iodée (Bétadine® dermique) 10% unidose
- Povidone iodée (Bétadine® dermique) 10% multidose
- Solution à base d'hypochlorite de sodium (Amukine®) si allergie PVI
- Autre, précisez :

Q2 : Réalisez-vous une anesthésie par application de Xylocaïne® (lidocaïne) 2 % gel urétral ?

Oui Non

- Si oui, précisez à quel moment le gel anesthésique est instillé :
Avant l'antiseptie Après l'antiseptie

Q3 : Quelle est la technique que vous privilégiez pour la désinfection chirurgicale des mains ?

- désinfection chirurgicale des mains par friction hydro alcoolique
- lavage chirurgical des mains

Q4 : Réalisez-vous systématiquement une antibioprophylaxie par injection intracaméculaire de céfuroxime 1 mg (hors contexte d'allergie aux céphalosporines) :

Oui Non

Si oui, l'aiguille filtrante du kit est-elle systématiquement utilisée ?

Oui Non

Q5 : Pour l'irrigation externe de l'œil en peropératoire, utilisez-vous systématiquement une présentation unidose stérile de BSS (ou autres solutions physiologiques) ?

Oui Non

Si non, prélevez-vous du BSS en seringue après recueil dans une cupule stérile du soluté avant connexion au phaco ?

Oui Non

Q6 : Pour la dilatation de l'œil, vous utilisez :

(plusieurs réponses possibles)

- des collyres multidoses servant à plusieurs patients
- des collyres unidoses, une dosette par patient
- des collyres unidoses, une dosette par instillation
- des inserts mydriasset et en êtes satisfait
- des inserts mydriasset et avez rencontré des difficultés d'utilisation
- la spécialité Mydrane en intracaméculaire
- Autres, précisez :

Q7 : Pour la prise en charge post opératoire :

- Le premier pansement est ouvert le jour même de l'intervention par le patient (instillation collyre) ?
Oui Non
- Remettez-vous une information écrite au patient sur les conseils à suivre en post opératoire ?
Oui Non
- Indiquez le nombre de collyres prescrits en post-op en dehors de toute autre pathologie oculaire :