

Points Covid 19

20/11/2020

Définitions de cas

7/05/2020

- **Cas possible** : toute personne ayant ou non été en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes, présentant des signes cliniques évocateurs de COVID-19
- **Cas probable** : toute personne présentant des signes cliniques et des signes visibles au scanner thoracique évocateurs de COVID-19
- **Cas confirmé** : toute personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique confirmant l'infection par le SARS-CoV-2, par RT-PCR ou par sérologie dans le cadre d'un diagnostic de rattrapage

16/11/2020

- **Cas possible** : toute personne ayant ou non été en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes, présentant des signes cliniques évocateurs de COVID-19
- **Cas probable** : toute personne présentant des signes cliniques et des signes visibles au scanner thoracique évocateurs de COVID-19
- **Cas confirmé** : toute personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique confirmant l'infection par le SARS-CoV-2, par amplification moléculaire (RT-PCR ou RT-LAMP), **par test antigénique** ou par sérologie dans le cadre d'un diagnostic de rattrapage

Définitions des contacts

7/05/2020

- Mesures de protection efficaces :
 - Hygiaphone ou vitre
 - Masque chirurgical ou FFP2, porté par le cas ou le contact
 - Masque grand public AFNOR porté par le cas et le contact

16/11/2020

- Mesures de protection efficaces :
 - Séparation physique **créant 2 espaces indépendants** (vitre, hygiaphone)
 - Masque chirurgical ou FFP2 ou grand public AFNOR **catégorie 1 ou grand public en tissu réutilisable possédant une fenêtre transparente homologué par la Direction générale de l'armement**, porté par le cas ou le contact
 - Masque grand public AFNOR **catégorie 2, ou pour lequel la catégorie AFNOR n'est pas connue**, porté par le cas et le contact
- **Ne sont pas considérées comme des protections efficaces :**
 - **Plaque de plexiglas posée sur une surface**
 - **Masque en tissu « maison »**
 - **Visière en plastique portée seule**

Définitions des contacts

7/05/2020

- Contact à risque :
 - Même lieu de vie
 - Face à face < 1 m quelle que soit la durée
 - Face à face pendant épisodes de toux ou d'éternuements
 - Actes d'hygiène ou de soins
 - Partage d'espace confiné > 15 min
- Contact à risque négligeable :
 - Autres situations...
 - Cas déjà identifié par RT-PCR ou sérologie

16/11/2020

- Contact à risque :
 - Même lieu de vie
 - Face à face < 1 m quelle que soit la durée
 - Face à face pendant épisodes de toux ou d'éternuements
 - Actes d'hygiène ou de soins
 - Partage d'espace confiné > 15 min
consécutives ou cumulées sur 24 h
- Contact à risque négligeable :
 - Autres situations...
 - ATCD d'infection par le SARS-CoV-2 < 2 mois, confirmé par RT-PCR ou RT-LAMP, **test antigénique** ou sérologie

Tests antigéniques

Nombreux texte et reco :

- Avis HAS 8 octobre 2020 , Avis HCSP 23 octobre, MINSANTE N° 177 du 28 octobre, MARS et MINSANTE du 16 novembre
- Déploiement à large échelle des tests antigéniques
- Implication des professionnels de santé libéraux autorisés à pratiquer ces test : médecins, pharmaciens et IDE
- Saisie des résultats des tests (positifs et négatifs) via un portail web “SI-DEP IV” .


Tutoriel: https://frama.link/SI-DEP_PRO

Test antigénique : pour qui?

Dépistage ciblé « patient asymptomatique »:

1. **patients admis aux urgences dans un établissement de santé**, pour prendre les bonnes décisions de prise en charge en cas de positivité
2. **dépistage des professionnels** qui interviennent auprès des personnes à risque de forme grave = réalisation de tests antigéniques rapides au profit de l'ensemble des personnels qui rentreraient de congés ou si la situation le nécessite.


Doctrine de dépistage



Indications

Interprétation

Doctrine de dépistage



Priorité test RT-PCR : pour qui ?

MINSANTE N°2020_198 du 18/11/2020

- **Priorité 1** : *examen dans les 24h et résultats dans les 24h suivantes.*

- Personnes avec **prescription médicale**, personnes **symptomatiques** et **sujets contact** : contact-tracing CPAM/ARS et les personnes contacts informées par l'application TousAntiCovid ;
- **Professionnels de santé** et assimilés intervenant au **domicile** (professionnels de santé ES et EMS accès au test au sein de leur structure de rattachement) ; **SSIAD HAD ???**
- **Professionnels exerçant dans les écoles, collèges et lycées**

- **Priorité 2** : *dépistage non prioritaires. résultats selon la capacité du laboratoire*

- Tout autre situation non citée précédemment, notamment les personnes souhaitant disposer d'un test dans le cadre d'un voyage, ou des dépistages préventifs organisés dans des établissements scolaires, des services publics ou des entreprises, sans lien avec un risque précisément identifié

Disposition EHPAD:

Vérifier que chaque EHPAD:


- mette en place en son sein une **organisation dédiée à la réalisation des prélèvements** (désignation d'un professionnel de santé référent, actions de formation des aides-soignants),
- puisse mobiliser, en tant que de besoin, des **ressources externes pour former ses professionnels et / ou pour réaliser les prélèvements** (en lien par exemple avec les Unions régionales des professionnels de santé, et en activant si nécessaire les modalités dérogatoires de rémunération des professionnels libéraux intervenant en EHPAD)
- avoir accès à un plateau technique pour faire analyser les prélèvements.

Dans la mesure du possible, les **prélèvements** devront être effectués **au sein de l'EHPAD** et adressés à un **laboratoire en capacité de rendre des résultats dans les 24h**.


Transfert MCO-SSR/EHPAD et levée d'isolement

- Référence avis HCSP 23 octobre 2020
- MARS N°2020_104 du 16 novembre 2020
- MINSANTE N°2020_192 du 16 novembre 2020

Patient atteint d'une forme non grave hospitalisé




Patient hospitalisé en réa ou forme grave en MCO



Patient asymptomatique hospitalisé en MCO découverte fortuite RT-PCR+

non
immunodéprimé



Immunodéprimé

