



QUIZZ / MEDICAL



Question 1 :

Les nouveaux antibiotiques sont réservés à l'usage hospitalier parce que :

Cocher la ou les réponse(s) vraie(s)

- 1/ Ils coûtent très cher
- 2/ Ils ont une marge thérapeutique étroite
- 3/ Ils ne sont actifs que sur les bactéries multirésistantes ou hautement résistantes
- 4/ Leur usage étendu peut faire émerger de nouvelles résistances bactériennes
- 5/ Cela permet de cibler (ou limiter) leur utilisation



Question 2 :

Concernant les colites à *Clostridioides difficile*, lesquelles sont exactes ?

- 1/ Elles peuvent survenir avec tous les antibiotiques y compris la vancomycine et le métronidazole
- 2/ Elles ne touchent que les sujets âgés ou fragiles
- 3/ Elles peuvent survenir après une dose unique d'antibiotique
- 4/ La poursuite de l'antibiothérapie est un facteur d'échec de la prise en charge
- 5/ Les récurrences sont plus fréquentes quelle que soit l'antibiothérapie chez les personnes ayant déjà présenté un épisode



Question 3 :

Parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui justifient à elles seules un traitement anti infectieux ?

- 1/ Présence de *Candida albicans* > 10⁵ UFC/mL dans les urines chez un patient sondé à demeure
- 2/ Présence de SARM sur une plaie chez un patient diabétique
- 3/ Présence de *Pseudomonas aeruginosa* (> 10⁵) dans l'expectoration


- 4/ Une hémoculture positive à *Klebsiella pneumoniae*
- 5/ Une hémoculture positive à *Staphylococcus epidermidis*



Question 4 :

Quelles précautions ? Pour qui et pourquoi ? Cocher le numéro de la (ou des) proposition(s) exacte(s)

- 1/ L'application systématique des précautions standard est le moyen le plus simple pour limiter la transmission d'agents pathogènes
- 2/ L'identification d'un patient à risque de portage BHRé (Bactérie hautement résistante et émergente) relève de l'interrogatoire médical initial du patient et conditionne la recherche de portage digestif par écouvillonnage rectal
- 3/ Tout patient présentant une diarrhée sous antibiotique nécessite la mise en place aussitôt que possible de mesures d'hygiène spécifiques et la recherche de *Clostridioides difficile* toxigène dans les selles
- 4/ Devant une toux, des diarrhées ou des vésicules cutanées, l'étiologie infectieuse doit être recherchée et des mesures adaptées doivent être mises en œuvre dès que possible
- 5/ Je contrôle systématiquement l'éradication du portage d'une BMR (Bactérie Multi Résistante) par un ECBU ce qui me permet de lever les mesures d'isolement



Question 5 :

Concernant la vaccination, quelles sont les propositions exactes ?

- 1/ La vaccination va permettre de réduire la pression sur le système hospitalier en phase épidémique
- 2/ Seuls les vaccins contre les infections bactériennes (pneumocoque, méningocoque...) permettent de diminuer la consommation d'antibiotiques
- 3/ Seule la vaccination chez les enfants a un effet significatif sur la diminution de la consommation d'antibiotiques
- 4/ La vaccination des soignants contre la grippe n'a pas d'effet sur la survenue d'épidémies dans les services
- 5/ En dehors des enfants et des patients immunodéprimés, il n'est pas nécessaire de faire un suivi de la couverture vaccinale des patients présentant une pathologie chronique

Merci d'avoir répondu à ce quizz !