

ANGINE

MEDECIN

TENSION
D'APPROVISIONNEMENT
EN AMOXICILLINE



Jamais d'antibiotique pour les infections virales : une [ordonnance de non-prescription](#) peut être remise au patient

Prise en charge des angines aiguës :

- Réalisation d'un [test rapide d'orientation diagnostique \(Trod\)](#) à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (Streptatest®)

ou

- Rédaction d'une [ordonnance de dispensation conditionnelle pour les antibiotiques](#)⁽¹⁾ en inscrivant sur l'ordonnance « Si Trod angine positif, sous x jours » : le pharmacien ne délivrera l'antibiotique que si le résultat du Trod réalisé à l'officine est positif (l'ordonnance doit être datée au plus de 7 jours)

Des [recommandations de bonne pratique](#) ont été élaborées par la Haute Autorité de Santé :

La durée d'un traitement par antibiotiques oraux dans la plupart des pathologies infectieuses courantes est **limitée à 5 jours**

Le TROD, un outil décisionnel ESSENTIEL



PHARMACIEN

Prise en charge des angines aiguës :

- Vérification de la présence du résultat du Trod, devant toute prescription d'amoxicilline
En cas de doute, le médecin peut être contacté ou le Trod peut être refait à l'officine (à partir de 10 ans) ;
- Si un patient de plus de 10 ans se présente avec les symptômes d'une angine et sans consultation médicale préalable, un [Trod angine](#) peut être effectué (utilisation du score de Mac Isaac pour les patients de plus de 15 ans)⁽²⁾

Chaque pharmacien d'officine qui réalise un TROD angine doit disposer d'une formation ([art. 4 de l'arrêté du 29 juin 2021](#))
[Plus d'information sur le site du CNOP](#)

Dispensation des antibiotiques autant que possible dans des conditionnements adaptés : durée de traitement de 5 jours, recommandée dans la plupart des pathologies infectieuses courantes (angines bactériennes, otites, pneumonies...)

[La dispensation à l'unité des spécialités](#) est à prioriser dès que cela est possible.

Les antibiotiques, c'est toujours pas automatique... le TROD si !