

Les incontournables de la prise en charge d'un cas de gale



Dès la suspicion

(association d'un prurit (à recrudescence nocturne) et présence de lésions cutanées (eczématiformes et de grattage).



Mettre en place les Précautions complémentaires contact « gale » :

- Réaliser une hygiène des mains par lavage simple (eau + savon) et si nécessaire FHA à distance sur des mains parfaitement sèches
- Porter les EPI dès la prise en charge du patient (surblouse à manches longues et gants à UU)
- Prendre en charge les textiles pour un traitement adapté
- Arrêter les activités extérieures pour le cas
- Demander une confirmation par un dermatologue de la pathologie

Il ne faut pas :

- Attendre le diagnostic de gale pour mettre en place les mesures
- Utiliser exclusivement la solution hydro alcoolique
- Ne pas se protéger avec des EPI dès la prise en charge de la personne

Repérage des contacts



Définir les contacts :

- 1^{er} cercle : personnes ayant eu un contact cutané prolongé avec la personne atteinte
- 2^{ème} cercle : personnes vivant ou travaillant dans la même collectivité
- 3^{ème} cercle : personnes visitant occasionnellement et entourage familial des personnes fréquentant régulièrement la collectivité.

Il ne faut pas oublier :

- La famille
- Les autres professionnels

Mise en place des traitements



Réaliser un traitement médicamenteux collectif :

- Le même jour pour le cas et les contacts à renouveler entre J8 et J14 (idéalement J10) :
 - Gale commune : traitement des contacts du 1^{er} cercle.
 - Gale profuse, hyperkératosique ou épidémique : traitement de tous les contacts du 1^{er} et 2^{ème} cercle, voire le 3^{ème} cercle

Il ne faut pas :

- Traiter uniquement le cas
- Réaliser qu'une seule prise de traitement médicamenteux
- Réaliser un traitement collectif non simultané (cas + contact)

Associer le traitement du linge et de l'environnement :

- 12h après la prise médicamenteuse

Identifier le linge utilisé (vêtements, linge de toilette et literie) :

- Linge porté dans les 3 derniers jours (8 derniers jours si gale profuse ou hyperkératosique)

Traitement du linge :

- Lavage à 60°
- Sinon utiliser un produit acaricide ou mettre en quarantaine dans un sac fermé pendant 3 jours

Il ne faut pas oublier :

- Les chaussons
- Les objets et les surfaces en tissu non lavables