



Ensemble, diminuons la
résistance aux antibiotiques
chez la personne âgée !

Quiz Médicaux



Question 1

Infections urinaires

Cochez les affirmations correctes

- 1/ La bandelette n'a aucun intérêt chez les patients porteurs de sonde vésicale.
- 2/ Un ECBU est justifié en cas d'urines troubles et malodorantes.
- 3/ Un ECBU de contrôle reste indiqué après traitement d'une pyélonéphrite grave.
- 4/ Un ECBU doit être systématiquement réalisé au moment du changement de sonde vésicale afin de détecter la présence de bactéries multi-résistantes dans les urines.
- 5/ Un traitement par quinolone est une alternative thérapeutique en cas de cystite simple.
- 6/ En cas de pyélonéphrite, l'association amoxicilline-acide clavulanique est le traitement à privilégier en présence d'un E. coli sensible à l'amoxicilline.




Question 2

Infections respiratoires

Cochez les affirmations correctes

- 1/ Un(e) résident(e) vient de faire une fausse route pendant son petit déjeuner, vous débutez une antibiothérapie le jour même par amoxicilline - acide clavulanique
- 2/ Un(e) patient(e) a fait une pneumonie traitée par amoxicilline - acide clavulanique, s'il (elle) est apyrétique et non oxygéo-requérante après 3 jours, il est possible d'arrêter les antibiotiques au 5^{ème} jour.
- 3/ Les fluoroquinolones, en dehors de leur impact écologique, doivent être évitées chez les patients âgés en raison de leurs effets indésirables.
- 4/ Chez un(e) résident(e) qui a des troubles de la déglutition, il est préférable d'écraser son traitement antibiotique pour le mélanger avec son yaourt.
- 5/ En situation de fin de vie, en cas d'encombrement, une antibiothérapie par ceftriaxone par voie sous-cutanée améliore le confort du patient.



Question 3

Prévention des infections et vaccination

Cochez les affirmations correctes

- 1/** Le rappel des précautions standard et complémentaires par les professionnels médicaux auprès des patients, familles, personnels paramédicaux et intervenants permet de lutter contre les surinfections et agissent contre l'antibiorésistance.
- 2/** La connaissance et le suivi vaccinal des personnes âgées diminuent le risque de surinfections et jouent un rôle non négligeable dans la diminution des événements cardio-vasculaires graves chez ces populations.
- 3/** La mise en place des précautions complémentaires en EHPAD n'est utile qu'en cas d'épidémie.
- 4/** La mise en place de précautions complémentaires contact impose que le résident d'un EHPAD reste en chambre pour les repas.
- 5/** Le vaccin « Zona » est recommandé chez tous les résidents d'EHPAD pour éviter la transmission du virus.



Question 3

Infections cutanées

Cochez les affirmations correctes

- 1/** Un patient se présente suite à l'apparition brutale d'un placard inflammatoire bien circonscrit de la jambe droite associé à une fièvre. Devant ce tableau vous évoquez, en priorité, le diagnostic de dermohypodermite bactérienne non nécrosante.
- 2/** Vous diagnostiquez une dermohypodermite non nécrosante dont le point de départ est un intertrigo chez une patiente en surpoids de 75 ans. Vous mettez donc en place une antibiothérapie par Amoxicilline-Acide clavulanique pendant 7 jours.
- 3/** Vous diagnostiquez un furoncle compliqué au niveau de la joue droite d'un patient de 80 ans. Vous décidez donc de mettre en place une antibiothérapie locale et per os après réalisation d'un prélèvement bactériologique du pus.
- 4/** Devant un abcès de l'aisselle, vous prescrivez, en première intention, une antibiothérapie par Pristinamycine ou Clindamycine pendant 5 jours et prévoyez, en cas d'échec, une incision et un drainage du pus.
- 5/** En cas d'impétigo peu étendu au niveau de l'abdomen, une antibiothérapie locale par Mupirocine pendant 5 jours est recommandée associée à des soins de toilette (nettoyage à l'eau et au savon).



Question 4

Diarrhées infectieuses

Cochez les affirmations correctes

- 1/** Les cas groupés de gastro-entérites chez la personne âgée en institution sont d'origine bactérienne majoritairement ?
- 2/** La mise en évidence d'une diarrhée à rotavirus chez un résident de l'EHPAD rend inutile la mise en place de précautions complémentaires à son égard.
- 3/** Les colites à Clostridioides difficile peuvent survenir après une dose unique d'antibiotique, avec tous les antibiotiques y compris la vancomycine et le métronidazole.
- 4/** La poursuite de l'antibiothérapie est un facteur d'échec de la prise en charge des colites à Clostridioides difficile.
- 5/** Les récurrences des colites à Clostridioides difficile sont plus fréquentes quelle que soit l'antibiothérapie chez les personnes ayant déjà présenté un épisode.