

Dépistage et prise en charge des cas de BHRe en Hémodialyse

2^{ÈME} JOURNÉE RÉGIONALE PRI ET BUA EN HÉMODIALYSE

19 SEPTEMBRE 2024



Les BHRe en Dialyse, Occitanie



Depuis 2018

35 épisodes de
BHRe

(dont 4 épisodes de cas groupés)

23 ERV

7 E.coli

7 K.pneumoniae

11 OXA-48

Seulement 4 cas en lien avec l'étranger



Enquête nationale PHYDEL (H.Marini, CHU Rouen)


PHYDEL = **P**ratiques d'**HY**giène déclarées en hémodyalyse : **E**tat des **L**ieux (2019)

200 UD tirées au sort (à partir de la base de REIN) => 103 ont accepté de répondre

Questionnaire papier + entretien téléphonique avec IDEH

Organisation des soins
Formation des professionnels
Gestion des risques
Information et éducation des patients
Hygiène des mains

Gestion du risque de transmission croisée
Vacances, BHRe
Abords vasculaires
Prévention des AES
Bionettoyage



Enquête nationale PHYDEL (H.Marini, CHU Rouen)

Résultats : vacances, BHRe



Difficultés rapportées

Concernant la mise en place d'un **système de repérage** des patients à risque de **portage de BHRe** :

Repérage des patients à risque de portage de BHRe : **37%** [28 ; 47]

Repérage informatisé des patients porteurs de BHRe : **41%** [32 ; 50]

Repérage informatisé des patients contacts de BHRe : **32%** [24 ; 42]

Concernant la **prise en charge d'un patient BHRe**:

Avez-vous déjà pris en charge des patients BHRe : **61%** [52 ; 10]

Dépistage digestif régulier chez les patients porteurs de BHRe : **50%** [41 ; 60]

Mise en place d'un personnel dédié : **30%** [21 ; 10]

Mise en place d'une marche en avant : **64%** [53 ; 74]

Fréquence de dépistage des contacts :

Hebdomadaire : **35%** [26 ; 45]

Mensuel : **15%** [9 ; 23]

Autre : **26%** [19 ; 35]

Concernant les **retours de vacances** :

Dépistage systématique au retour de vacances : **41%** [32 ; 50]

Précautions Complémentaires Contacts (PCC) systématique au retour de vacances : **33%** [24 ; 42]

Concernant l'**accueil** de patient en **vacances** dans l'unité :

Dépistage systématique (patient provenant d'une unité de dialyse extérieure) : **26%** [18 ; 35]

Dépistage en fonction du centre de l'unité de provenance du patient **47%** [38 ; 57]

Dépistage demandé avant l'arrivée du patient dans l'unité : **51%** [37 ; 65]

Dépistage réalisé à l'arrivée du patient dans l'unité : **40%** [28 ; 5]

Mise en PCC systématique : **6%** [3 ; 12]

Manque d'information ou
information tardive sur le
statut BHRe des patients

Manque de
chambre
seule/**box** pour
isoler les patients
porteurs de BHRe

Absence de
connaissances sur la
gestion des patients BHRe

Absence de
politique claire
pour la prise en
charge des BHRe
en hémodialyse

Absence de
procédure pour la
prise en charge
des BHRe