

# TOUS ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA VACCINATION DES PATIENTS

# Vaccination Grippe

## Public cible

### Recommandations générales



65 ans et +

Jeunes de 2 à 17 ans  
(avis HAS du 09/03/23)



### Recommandations particulières



Femmes enceintes, patients hospitalisés en Soins de suite et ESMS, maladies chroniques, immunodéprimés, ...

### Professionnels



- Tous les professionnels de santé
- Contact régulier et prolongé avec personnes à risque,
- Exposés aux virus influenza porcins et aviaires
- Navigants (bateaux de croisière et avions) et de l'industrie des voyages



Pour plus d'info

## Impact sanitaire

Saison 2023/2024

**1,5 millions de consultations** pour syndrome grippal

**73 000 passages aux urgences**


**14 000 hospitalisations**

**1 862 décès : 88% ont + de 65 ans**



## Complications de la grippe

**Surinfection bactérienne** (pneumonie),  
**Décompensation pathologies chroniques** (diabète, asthme, maladie cardiaque, insuffisance rénale ...)



Risque de **COMPLICATIONS GRAVES** voire de **DÉCÈS !**

## Couverture vaccinale



**Population à risque : 47,1 %**  
(2023/2024 SPF)



**Personne 65 ans et + : 54 %**  
(2023/2024 SPF)

Professionnels de santé en :



**ES\* : 19 %** (2022/2023 HAS)

**EHPAD : 24,7 %** (2023/2024 SPF)

**EHPH\*\* : 13,5 %** (2023/2024 SPF)

ES\* : Etablissement de santé - EHPH\*\* : Etablissement hébergeant personnes du handicap

**très insuffisante**



2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

## Prévention

### Gestes barrières



**Hygiène des mains**



**Aération fréquente des pièces**



**Nettoyage régulier des surfaces**



**Port du masque à usage unique :**

syndrome grippal, contact personnes fragiles pendant la période de circulation du virus et épidémie en structure de soins

### Vaccination

**Vaccins antigrippaux disponibles 2024/2025 :**

- Fluarix Tetra®, Vaxigrip Tetra®, Influvac Tetra® (à partir de 6 mois)

**1\* injection par an pour sauver des milliers de vies**

\*De 6 mois à 8 ans révolus, si 1ère vaccination contre la grippe, administrer une 2ème dose (intervalle d'au moins 4 semaines)

**Vaccination concomitante Grippe + COVID fortement recommandée (pour le public cible)**

**Une infection évitée, c'est souvent une antibiothérapie épargnée !**