

TOUS ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA VACCINATION DES PATIENTS FRAGILES

Septembre 2024

Vaccination Coqueluche



Risques

CONTAGIOSITE +++

En 2024 :

- Recrudescence des cas
- Déjà **28 décès** pour le 1er semestre !

Nourrissons non vaccinés < 6 mois sont à risque de **formes graves**

⚠ Complications de la coqueluche

- Quinte asphyxiante, apnée, bradycardie profonde
- Coqueluche maligne : détresse respiratoire, défaillance multi-viscérale
→ Risque ++ chez nourrisson < 3 mois
- Encéphalopathie coquelucheuse (rare)

Public cible

Recommandations générales



Nourrissons

OBLIGATOIRE
depuis janvier 2018

Recommandations particulières



Femmes enceintes
entre 20 et 36 SA à chaque grossesse



Entourage des nourrissons
Stratégie du cocooning si absence de vaccination pendant la grossesse ou < 1 mois avant la naissance

Professionnels



Pour plus d'info

Couverture vaccinale

Professionnels de santé : **50 à 73 %**

Nourrissons : **90,9 %** à 3 doses → **Pourtant OBLIGATOIRE** pour tous

Femmes enceintes : **< 20 %**

Cocooning : **42 à 59 %**

Données HAS
2024

Conduite à tenir autour d'un cas



*Découvrez la
conduite à tenir !*



Nouveautés

Recommandations HAS Juillet 2024 :

Si dernière injection > 5 ans, dose de rappel pour :

- Entourage proche du nouveau/né nourrisson
- Tous les professionnels travaillant au contact des nouveau-nés et nourrissons < 6 mois

Il n'existe **PAS de vaccin anticoquelucheux seul**
et le vaccin DTP sans valence coqueluche n'est plus commercialisé

→ Il faut donc réaliser une **vaccination combinée**

1 mois de délai entre les vaccins si la coqueluche doit être refaite :
pas de risque pour le patient

Une **infection évitée**, c'est souvent une **antibiothérapie épargnée** !