

















Dès suspicion de la pathologie	Précautions Standard	Chambre seule recommandée	Précautions complémentaires		Hygiène des mains professionnels	Précautions résidents	Précautions visiteurs	Bionettoyage	Personnes à contacter	Durée des mesures
			Type	EPI associés						
BMR Bactérie Multi Résistante aux antibiotiques	<p>PAR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, POUR TOUT SOIN, EN TOUT LIEU, POUR TOUT RÉSIDENT, QUEL QUE SOIT SON STATUT INFECTIEUX</p>	✓						Entretien quotidien avec détergent-désinfectant : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol	« Avis référent en antibiotithérapie » avant prescription ATB (EMA)	Avis EMH Pas de prélèvement de contrôle
BHRe Bactérie Hautement Résistante aux antibiotiques	<p>EPI associés aux Précautions Standard :</p> <p>Hygiène des mains par solution hydro-alcoolique</p> <ul style="list-style-type: none"> A l'entrée et à la sortie de la chambre, Avant tout geste propre, Après tout geste sale 	✓						Entretien quotidien avec détergeant-désinfectant : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion des excréta : Vdef-A5 BMR-BHRe en EMS Mode d'emploi (cpias-occitanie.fr)	« Avis référent en antibiotithérapie » avant prescription ATB (EMA)	Avis EMH pour analyser le risque, accompagner et évaluer le respect des Précautions Standard
Infection à Clostridioides difficile	<p>Prélèvements, toilette intime...</p> <p>Soins mouillant/souillant Toilettes, changes et autres soins à risque...</p>	✓		 Dès l'entrée dans la chambre Retrait avant sortie				Entretien quotidien avec détergent-désinfectant (dD) sporicide : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion des excréta Cas-ICD.pdf (cpias-occitanie.fr)	« Avis référent en antibiotithérapie » avant prescription ATB (EMA) EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	48 à 72 h après arrêt diarrhée (au moins 3 selles) liquides/24 h Pas de prélèvement de contrôle (recherche CD) en l'absence de diarrhée Avis EMH
Conjonctivite virale	<p>Gestes à risque de projection Ponctions, vidanges poches, soins à risque de vomissement...</p>							Entretien quotidien avec dD virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais	Si cas groupés, contacter EMH pour investigation	Jusqu'à guérison
Coronavirus	<p>Gestes à risque d'aérosolisation Kiné respiratoire, aérosol, aspiration et O2>6 L...</p> <p>FFP2</p>	✓		 Dès l'entrée dans la chambre				Entretien quotidien avec dD virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais, sanitaire et sol	EPS PA et EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Avis EMH / EPS PA
Diarrhée infectieuse (GEA, rotavirus, Salmonella typhi, shigella...)	<p>Déchets d'activité de soins non recyclables sauf objets perforants A conditionner avant sortie de la chambre</p> <p>Uniquement pour matériel en contact avec le site infecté</p>	✓		 Dès l'entrée si diarrhée et vomissement				Entretien quotidien avec dD virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion des excréta => Cas-groupes-GEA.pdf (cpias-occitanie.fr)	EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Origine virale : Au moins 3 jours après l'arrêt des diarrhées Origine bactérienne : Tant que persiste la bactérie dans les selles

Dès suspicion de la pathologie	Précautions Standard	Chambre seule	Précautions complémentaires		Hygiène des mains professionnels	Précautions résidents	Précautions visiteurs	Bionettoyage	Personnes à contacter	Durée des mesures
			Type	EPI associées						
Gale	<p>PAR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, POUR TOUT SOIN, EN TOUT LIEU, POUR TOUT RÉSIDENT, QUEL QUE SOIT SON STATUT INFECTIEUX</p>  <p>EPI associés aux Précautions Standard :</p> <p>Hygiène des mains par solution hydro-alcoolique</p> <ul style="list-style-type: none"> • A l'entrée et à la sortie de la chambre, • Avant tout geste propre, • Après tout geste sale <p>Contacts liquides biologiques et mains lésées</p> <p>Prélèvements, toilette intime...</p> <p>Soins mouillant/souillant</p> <p>Toilettes, changes et autres soins à risque...</p> <p>Gestes à risque de projection</p> <p>Ponctions, vidanges poches, soins à risque de vomissement...</p> <p>Gestes à risque d'aérosolisation</p> <p>Kiné respiratoire, aérosol, aspiration et O2>6 L...</p> <p>Déchets d'activité de soins non recyclables sauf objets perforants</p> <p>A conditionner avant sortie de la chambre</p>  <p>Uniquement pour matériel en contact avec le site infecté</p>	✓	<p>Précautions complémentaires contact</p>  <p>Dès l'entrée dans la chambre Retrait avant sortie</p>	<p>+</p> 		<p>Entretien quotidien avec dD : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol</p> <p>Gestion du linge et entretien surfaces en tissu</p> <p>Gale_Cas_isole_2020relu.pdf (cpias-occitanie.fr).</p>	<p>EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir</p>	<p>48 heures après traitement</p> <p>Si gale profuse ou hyperkératosique : avis EMH</p>		
Grippe		✓	<p>Précautions complémentaires gouttelettes</p>  <p>Dès l'entrée dans la chambre</p>			<p>Aération régulière de la chambre, porte fermée, pas de courant d'air</p> <p>Entretien quotidien avec dD : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol</p> <p>Cas-groupe-IRA.pdf (cpias-occitanie.fr).</p>	<p>EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir</p>	<p>7 jours après le début des signes cliniques</p>		
Légionellose							<p>EMH : pour investigation</p>	<p>Pas de transmission inter humaine</p>		
Zona			<p>Précautions complémentaires contact</p>  <p>Si contact avec lésion</p>			<p>Entretien quotidien avec détergeant-désinfectant virucide : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol</p>	<p>EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir</p>	<p>Jusqu'à la chute des croûtes</p>		
VRS		✓	<p>Précautions complémentaires gouttelettes</p>  <p>Dès l'entrée dans la chambre</p>		 <p>En présence d'autres personnes</p>	<p>Aération régulière de la chambre, porte fermée, pas de courant d'air</p> <p>Entretien quotidien avec détergeant désinfectant virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol</p>	<p>Si cas groupés, contacter EMH pour investigation</p>	<p>7 jours</p> <p>Résident immunodéprimé : avis EMH</p>		
Autres cas			Contactez votre EMH							

