


TOUS ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA VACCINATION DES PATIENTS

Vaccination Zona



Public cible



Immunodéprimés



Personnes âgées

Couverture actuelle



Moins de 5% du public cible

Or la seule prévention possible est la **vaccination**



Risque



1 personne sur 3 touchée par la maladie

Douleurs post-zostériennes dans 10 à 20% des cas



Augmente avec :

- l'âge 70 % des cas ont plus de 50 ans
- l'immunodépression



Complications du Zona

Cutanée



Ophthalmique



Neurologique



Cardiaque



Pulmonaire



Impacts sur le long terme

Troubles de l'humeur, du sommeil, dénutrition ou compensation de comorbidités, allant parfois jusqu'à l'**isolement**, la **perte d'autonomie** et l'entrée dans la **dépendance**

Nouveau vaccin inactivé (Shingrix®)

disponible en collectivités et ville, Taux remboursement 65%

Nettement plus efficace que l'ancien vaccin vivant atténué (Zostavax), y compris chez la personne âgée



- **79.3%** de l'incidence du zona
- **66.7%** du zona ophtalmique
- **76%** douleurs post-zostériennes

Nouveautés



Recommandations HAS :

- Plus de 65 ans
- Plus de 18 ans ayant un risque accru de zona

Schémas d'administration 2 doses IM espacée d'au moins de mois

Cas particuliers :

- zona récent : délai d'un an
- zona à répétition : possible dès guérison
- introduction prochaine d'une immunodépression : dès que possible

Administrable aux immunodéprimés

Référence : Place du Shingrix® dans la vaccination contre le zona : recommandations HAS

