

TOUS ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA VACCINATION DES PATIENTS

Vaccination Grippe

Public cible

Recommandations générales



65 ans et +

Jeunes
de 2 à 17 ans



Recommandations particulières



Femmes enceintes, patients hospitalisés en Soins de suite et ESMS, maladies chroniques, immunodéprimés, ...

Professionnels



- Tous les professionnels de santé
- Contact régulier et prolongé avec personnes à risque
- Exposés aux virus influenza porcins et aviaires
- Navigants (bateaux de croisière et avions) et de l'industrie des voyages

Impact sanitaire

Saison
2024/2025

2.7 millions de consultations pour syndrome grippal

155 950 passages aux urgences

28 700 hospitalisations

4 925 décès : 93% ont + de 65 ans



Complications de la grippe

Surinfection bactérienne (pneumonie),

Décompensation pathologies chroniques
(diabète, asthme, maladie cardiaque, insuffisance rénale ...)



Risque de
**COMPLICATIONS
GRAVES**
voire de **DÉCÈS !**

Couverture vaccinale



Population à risque : 46.5 %
(2024/2025 SPF)



Personne 65 ans et + : 53.7 %
(2024/2025 SPF)

Professionnels de santé en :



ES* : 19 % (2022/2023 HAS)

EHPAD : 21 % (2024/2025 SPF)

EHPH : 13 %** (2024/2025 SPF)

ES* : Etablissement de santé - EHPH** : Etablissement hébergeant personnes du handicap

très insuffisante



2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Prévention

Gestes barrières



Hygiène des mains



Aération fréquente
des pièces



Nettoyage régulier
des surfaces



Port du masque à usage unique :

syndrome grippal, contact personnes fragiles pendant la période de circulation du virus et épidémie en structure de soins

Vaccination

Vaccins antigrippaux disponibles : Vaccins trivalents

Pour les plus de 65 ans : Eflueda® (haute dose) et Flud® (adjuvanté)
les vaccins à dose standard peuvent également être utilisés

Vaccination concomitante Grippe + COVID fortement recommandée
(pour le public cible)

De 6 mois à 8 ans révolus, si 1ère vaccination contre la grippe, administrer une 2ème dose
(intervalle d'au moins 4 semaines)

Une **infection évitée**, c'est souvent une **antibiothérapie épargnée !**

