


LES DÉCHETS D'ACTIVITÉ DE SOINS

NOUVEAU GUIDE



WEBINAIRES

EN ESMS
REPLAY

EN ES
REPLAY

EN VILLE
INSCRIVEZ VOUS !

06/01/2026
14h30
15h30

FOCUS SUR LES GANTS

CPias Ile-de-France

Les précautions standard

Focus sur **les gants** au bon moment et à bon escient

QUAND ?

- Au plus près des soins / gestes :
- À risque de piqûre/coupure
- À risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée
- Si lésions cutanées sur les mains du soignant
- Si contact avec des produits chimiques

COMMENT ?

- Retirer les gants dès la fin du soin / geste
- Se désinfecter les mains par friction hydroalcoolique : avant le port des gants, après le retrait des gants
- Mettre les gants immédiatement avant le soin / geste

ATTENTION AU MÉSUSAGE

Ne pas porter de gants :

- lors des soins sur peau saine, quel que soit le statut infectieux du patient / résident (y compris BMR/BH-Re)
- dans les couloirs

Ne pas désinfecter les gants, y compris avec un produit hydroalcoolique

POURQUOI ?

Pour protéger le soignant des risques liés à l'exposition au sang, aux liquides biologiques et aux produits chimiques

POINT DE VIGILANCE

- Changer de gants entre chaque patient / résident
- Changer de gants entre 2 séquences de soin / geste chez un même patient / résident

Port de gants non raisonné → Faux sentiment sécurité → Frein à l'hygiène des mains → Favorise la transmission croisée

2024

srif SOCIÉTÉ DE RÉANIMATION DE L'OCÉANIE FRANÇAISE

SF2H Risque infectieux et soins

Gants à usage unique non stérile en réanimation

Le gant jetable est l'un des matériaux les plus utilisés en soins intensifs, de ce fait les gants sont un des postes les plus importants d'émissions de gaz à effet de serre et d'empreinte carbone. Une utilisation limitée à ses strictes indications entraîne un réel impact écologique et économique en réduisant l'émission de carbone de chaque étape du cycle de vie du gant (fabrication, emballage, transport, recyclage/élimination).

De plus, contrairement aux mains, les gants ne peuvent pas être désinfectés : limiter leur utilisation permet aussi de limiter le risque de contamination de l'environnement et des soignants.

INDICATION : RÔLE PROTECTEUR

Risque infectieux soignant	Risque chimique soignant	Risque physique soignant	Risque infectieux patient
• Contact avec les liquides biologiques (sang, selles, urines, sécrétions respiratoires), muqueuse ou peau lésée • Manipulation de déchets ou de linge souillé • Infection à Clostridioïde difficile, gale	• Préparation de certains médicaments (chimiothérapie) • Bioretoyage, désinfection du matériel	• Manipulation d'objet piquant, coupant, tranchant, souillé par le sang	• Transmission croisée d'une chambre à l'autre en cas de Clostridioïde difficile ou gale

En dehors de ces indications, le port de gants est inutile voire délétère.



Récupérez ce
poster interactif !

