


TOUS ENSEMBLE, AGISSEZ POUR LA VACCINATION DES PATIENTS FRAGILES

Vaccination Pneumocoque



Public cible




Personnes âgées de plus de 65 ans [Avis HAS janv 2025](#)



Toute personne à risque de plus de 2 ans



Nourrissons
OBLIGATOIRE
depuis janvier 2018



ex : immunodéprimés, maladies chroniques
à risque de forme grave

Couverture vaccinale



moins de 5% des personnes à risque



Risques

Germe **ORL** fréquent pouvant entraîner des **infections** :

- **bénignes** : otite, sinusite, conjonctivite
- **graves** : pneumonie, **infections invasives**
(bactériémie, septicémie, méningite, arthrite, ostéomyélite)



Augmente avec l'âge et la présence de comorbidités



Les pneumopathies à pneumocoque représentent la 1^{ère} cause de mortalité infectieuse des pays développés

La mortalité des infections invasives à pneumocoques varie de 10% à 30% selon les études

2 Nouveautés



Adultes à risque ≥ 18 ans et pour tous dès 65 ans : Vaccin Pneumococcique Conjugué 20 ou 21 Valen[®] recommandé en 1 injection (Prevenar 20 ou Capvaxive[®])

Pour les adultes ayant déjà reçu un ou des vaccins :

- Si 1 seule dose de **VPC 13** ou **VPP 23** depuis plus d'un an : 1 dose de **VPC 20 ou 21**
- Si 2 doses avec la séquence **VPC 13 - VPP 23** : 1 dose de **VPC 20 ou 21**, 5 ans après

Si le statut vaccinal est inconnu : proposer la vaccination aux personnes cibles

Enfants : Mise à disposition du **vaccin Pneumococcique Conjugué 15-valent (VPC 15) VAXNEUVANCE[®]** en alternative au VPC13

Référence : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-08/strategie_de_vaccination_contre_les_infections_a_pneumocoque_place_du_vaccin_vaxneuvance_chez_l_enfant_de_6_semaines_a_18_ans.pdf



La vaccination, un geste éco-responsable

Une infection évitée, c'est une antibiothérapie épargnée !



Capsule
vidéo patient

