

Dès suspicion de la pathologie	Précautions Standard	Chambre seule recommandée	Précautions complémentaires		Hygiène des mains professionnels	Précautions résidents	Précautions visiteurs	Bionettoyage / Gestion des excreta	Personnes à contacter	Durée des mesures / Mesures particulières
			Type	EPI associés						
BMR Bactérie Multi Résistante aux antibiotiques	PAR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, POUR TOUT SOIN, EN TOUT LIEU, POUR TOUT RÉSIDENT, QUEL QUE SOIT SON STATUT INFECTIEUX	✓						Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol	Avis EMH « Avis référent en antibiotithérapie » avant prescription ATB (EMA)	Pas de prélèvement de contrôle Informer le service ou structure si hospitalisation et ou consultation
BHRe Bactérie Hautement Résistante aux antibiotiques	Hygiène des mains par solution hydro-alcoolique • A l'entrée et à la sortie de la chambre, • Avant tout geste propre, • Après tout geste sale • Avant et après port de gants EPI associés aux Précautions Standard : Contacts liquides biologiques et mains lésées Prélèvements de sang, toilette intime... Soins mouillants/souillants Toilettes, changes et autres soins à risque... Gestes à risque de projection et/ou d'aérosolisation Ponctions, vidanges poches, kiné respi, aérosol, ...	✓						Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion des excreta : <u>Livret BMR-BHRe en EMS : Mode d'emploi</u>	Avis EMH pour analyser le risque « Avis référent en antibiotithérapie » avant prescription ATB (EMA)	Accompagner et évaluer le respect des Précautions Standard Informer le service ou structure si hospitalisation et ou consultation
Infection à Clostridioides difficile	en période épidémique Déchets d'activité de soins non recyclables sauf objets perforants A conditionner avant sortie de la chambre Pour les infections à prévention vaccinale	✓	Précautions complémentaires contact	Dès l'entrée dans la chambre Retrait avant sortie				Entretien quotidien avec d/D sporicide (norme EN17846) : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion des excreta <u>Cas ICD</u>	Avis EMH « Avis référent en antibiothérapie » avant prescription ATB (EMA) EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	48 à 72 h après arrêt diarrhée (au moins 3 selles) liquides/24 h Pas de prélèvement de contrôle (recherche CD) en l'absence de diarrhée
Conjonctivite virale								Entretien quotidien avec d/D virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais	Si cas groupés, contacter EMH pour investigation	Jusqu'à guérison
IRA : Infection Respiratoire Aiguë Coronavirus / Grippe / VRS		✓	Précautions Respiratoires Précautions complémentaires contact	Dès l'entrée dans la chambre en fonction du type de soins et du renouvellement d'air du type de soins et sa durée ou				Entretien quotidien avec d/D virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais, sanitaire et sol <u>Cas groupés IRA</u>	EPS PA et EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	7 jours et au moins 48h sans symptômes

Dès suspicion de la pathologie	Précautions Standard	Chambre seule	Précautions complémentaires		Hygiène des mains professionnels	Précautions résidents	Précautions visiteurs	Bionettoyage / Gestion des excreta	Personnes à contacter	Durée des mesures	
			Type	EPI associées							
Diarrhée infectieuse (GEA, rotavirus, Salmonella typhi, shigella...)	PAR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, POUR TOUT SOIN, EN TOUT LIEU, POUR TOUT RÉSIDENT, QUEL QUE SOIT SON STATUT INFECTIEUX Hygiène des mains par solution hydro-alcoolique - A l'entrée et à la sortie de la chambre, - Avant tout geste propre, - Après tout geste sale - Avant et après port de gants EPI associés aux Précautions Standard : Contacts liquides biologiques et mains lésées Prélèvements, toilette intime... Soins mouillant/souillant Toilettes, changes et autres soins à risque...	✓	Précautions complémentaires contact	Dès l'entrée si diarrhée et vomissement				Entretien quotidien avec d/D virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion des excreta => <u>Cas groupés GEA</u>	EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Au moins 3 jours après l'arrêt des diarrhées	
Gale	Contacts liquides biologiques et mains lésées Prélèvements, toilette intime... Soins mouillant/souillant Toilettes, changes et autres soins à risque...	✓	Précautions complémentaires contact	Dès l'entrée dans la chambre Retrait avant sortie				Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion du linge et entretien surfaces en tissu <u>Cas isolé de gale</u>	EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	48 heures après traitement	Si gale profuse ou hyperkératosique : avis EMH
Légionellose	Gestes à risque de projection et/ou d'aérosolisation Ponctions, vidanges poches, kiné respi, aérosol, ... en période épidémique								EMH : pour investigation	Pas de transmission inter humaine	
Zona	Déchets d'activité de soins non recyclables sauf objets perforants A conditionner avant sortie de la chambre Uniquement pour matériel en contact avec le site infecté		Précautions complémentaires contact	Si contact avec lésion				Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol	EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Jusqu'à la chute des croûtes	
Autres cas	Pour les infections à prévention vaccinale	Contactez votre EMH									

