

TOUS ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA VACCINATION DES PATIENTS

Vaccination Grippe

Public cible

Recommandations générales



Recommandations particulières



Femmes enceintes, patients hospitalisés en Soins de suite et ESMS, maladies chroniques, immunodéprimés, ...

Professionnels



- Tous les professionnels de santé
- Contact régulier et prolongé avec personnes à risque
- Exposés aux virus influenza porcins et aviaires
- Navigants (bateaux de croisière et avions) et de l'industrie des voyages

Impact sanitaire

Saison 2024/2025

3 millions de consultations pour syndrome grippal
158 000 passages aux urgences
30 000 hospitalisations
4925 décès directement liés à la grippe avec une surmortalité toutes causes confondues pendant l'épidémie de 17 600 décès
90% des personnes décédées ont + de 65 ans

Complications de la grippe

Surinfection bactérienne (pneumonie),

Décompensation pathologies chroniques (diabète, asthme, maladie cardiaque, insuffisance rénale ...)



Risque de **COMPLICATIONS GRAVES** voire de **DÉCÈS !**

Couverture vaccinale



Population à risque : 46.5 %
(2024/2025 SPF)



Personne 65 ans et + : 53.7 %
(2024/2025 SPF)

Professionnels de santé en :



ES* : 19 % (2022/2023 HAS)



EHPAD : 21 % (2024/2025 SPF)



EHPH : 13 %** (2024/2025 SPF)

ES* : Etablissement de santé - EHPH** : Etablissement hébergeant personnes du handicap

très insuffisante



2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Gestes barrières



Hygiène des mains



Aération fréquente des pièces



Nettoyage régulier des surfaces



Port du masque à usage unique :

syndrome grippal, contact personnes fragiles pendant la période de circulation du virus et épidémie en structure de soins

Prévention

Vaccination

Vaccins antigrippaux disponibles : Vaccins trivalents

Pour les plus de 65 ans : Eflueda® (haute dose) et Fluad® (adjuvanté)
les vaccins à dose standard peuvent également être utilisés

Vaccination concomitante Grippe + COVID fortement recommandée
(pour le public cible)

De 6 mois à 8 ans révolus, si 1ère vaccination contre la grippe, administrer une 2ème dose (intervalle d'au moins 4 semaines)

Une infection évitée, c'est souvent une antibiothérapie épargnée !

