

JOURNÉE RÉGIONALE DES RÉFÉRENTS EN ANTIBIOTHÉRAPIE

10.09.2026
Perpignan

Actualités JRA 2026



Référent en Antibiothérapie en ES

- Pack SPARES / boîte à outil



03/08/2026 / RéPIA, SPARES

**Prochain webinaire SPARES
« Focus sur le rôle du référent
en antibiothérapie » – 15
octobre 2026 à 14h**

LIRE LA SUITE



27/07/2026 / RéPIA, SPARES

**Pack référent en
antibiothérapie » : 2 premiers
outils sont disponibles**

LIRE LA SUITE

Référent en Antibiothérapie en ES



- Webinaire en Replay BUA en ES CRAtb Occitanie
- Fiche Outil : Indications des Fluoroquinolones en ES



Fluoroquinolones

quelles indications aujourd'hui ?



Etablissements sanitaires

INFECTIONS RESPIRATOIRES BASSES DE L'ADULTE



→ **PAS D'INDICATION**
sauf cas très particuliers

NE SONT PAS RECOMMANDES

Infections respiratoires de l'enfant, même en cas d'allergie aux bêta-lactamines
=> avis spécialisé nécessaire

NE SONT PAS INDICUES EN PREMIERE LIGNE

1. Traitement probabiliste de la pneumonie aiguë communautaire (PAC)
2. Traitement documenté des pneumopathies dues à :
 - a. *Legionella pneumophila*, sauf forme grave
 - b. *Mycoplasma pneumoniae*
 - c. *Chlamydiae pneum. et psittaci*
 - d. *Pseudomonas aeruginosa*
 - e. *Stenotrophomonas maltophilia*, possible uniquement en association avec un autre antibiotique
3. Infection/BPCO => En cas d'antécédents de colonisation à *P. aeruginosa*, un avis spécialisé doit être demandé.

ATB de référence (b et c) = macrolides ou cyclines

INFECTIONS ORL ET BUCCO-DENTAIRES



→ **PAS D'INDICATION**
sauf cas très particuliers

NE SONT PAS RECOMMANDES

1. Sinusite maxillaire aiguë
2. Otite externe (forme locale)
3. Angine
4. Infection bucco-dentaire

NE SONT PAS INDICUES EN PREMIERE LIGNE


1. Sinusite frontale, éthmoïdale, sphénoïdale, en cas d'allergie contre-indiquant l'utilisation des pénicillines et des céphalosporines.
2. Otite maligne externe

PEUVENT ETRE UTILISES

Dans toutes les situations où il existe une allergie grave aux antibiotiques de référence (sinusites autres que maxillaire et otite maligne externe)


Actualités BUA en premier recours

1.1. Comparaison des dispensations de TROD angine et cystite avec les délivrances d'antibiotiques entre 2023 et début 2026 pour 1000 habitants en France et en Occitanie



Entre 2023 et 2025, le recours aux TROD **augmente** nettement, en particulier à partir de **mi-2024**. Les TROD angine sont les plus utilisés et présentent **des pics hivernaux marqués**, tandis que les TROD cystite connaissent une montée progressive après leur introduction. Les tendances observées en **Occitanie** sont **globalement comparables** à celles de la France.

1.2. Comparaison des taux départementaux de recours aux TROD Angine avec le taux moyen régional d'Occitanie (pour 1 000 habitants) entre 2023 et Février 2026




Entre 2023 et 2025, les TROD angine présentent une **saisonnalité** caractérisée par **une augmentation à l'automne** et des pics observés durant la **période hivernale**. Des **disparités départementales** sont toutefois observées : **seuls quatre départements** présentent des taux globalement supérieurs au taux moyen régional d'Occitanie.

1.3. Comparaison des taux départementaux de recours aux TROD Cystite avec le taux moyen régional d'Occitanie (pour 1 000 habitants) entre 2023 et Février 2026

TROD cystite rapportés à la population départementale par mois

La ligne noire représente la moyenne de TROD cystite pour 1000 habitants de la région Occitanie.




Les TROD cystite augmentent nettement à partir du milieu de l'année 2024, en lien avec le **déploiement du dispositif**, puis se stabilisent à des niveaux variables selon les départements. Une **hétérogénéité territoriale** est observée : **quatre départements présentent des taux globalement supérieurs au taux régional d'Occitanie**, tandis que les autres départements restent proches ou en dessous de cette moyenne.


Antibioclic

Utilisation d'Antibioclic en Occitanie

Évolution entre 2024 et 2025



Variation 2024–2025 : +15,2 %



Variation 2024–2025 : -9,4 %

Source : Antibioclic

Entre parenthèses : part de l'Occitanie dans le total national de l'année



La Mission nationale PRIMO vous propose un webinaire qui a pour thème

« **Les otites de l'enfant** »

le Mardi 13 octobre 2026 de 13h à 14h

Avec le Pre Elise Launay, infectiologue pédiatre au CHU de Nantes.

Cette formation **GRATUITE** est ouverte à tous les professionnels de santé (même si essentiellement orientée vers les médecins généralistes et pédiatres).

[**> Pour en savoir plus et vous inscrire**](#)

Actualités en vaccinologie

- Pneumocoque :



Tableau 27. Résumé des recommandations de la HAS concernant la vaccination contre les infections à pneumocoques.

Groupe d'âge	Vaccin recommandé	Schéma vaccinal
Nourrissons		
Nourrissons (dès 8 semaines) et prématurés (< 37 sem.)	VPC20	Schéma 3+1 : 3 doses de primovaccination (2, 4 et 6 mois) + 1 dose de rappel à 11 mois
Enfants à risque		
Enfants à risque (15 mois à < 5 ans)	VPC20	Dose unique. Respecter un délai de 8 semaines après la dernière dose d'un VPC précédent
Enfants à risque (5 ans à < 18 ans)	VPC20	Dose unique. Respecter un délai de 8 semaines après la dernière dose d'un vaccin pneumococcique
Nourrissons et enfants non vaccinés		
Nourrissons non vaccinés (7 à < 12 mois)	VPC20	2 doses (intervalle $\geq$ 4 semaines) + 1 dose de rappel au cours de la 2e année
Nourrissons non vaccinés (12 à < 24 mois)	VPC20	2 doses (intervalle $\geq$ 8 semaines)
Enfants à risque non vaccinés (2 ans à < 5 ans)	VPC20	Dose unique
Adultes		
Adultes à risque (18 à 64 ans)	VPC21	Dose unique
Adultes (65 ans et plus)	VPC21	Dose unique

La HAS se prononce sur l'obligation vaccinale contre la grippe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mis en ligne le 20 juil. 2026

La HAS :

Considère que la vaccination antigrippale pour les **personnes de 65 ans et plus** vivant en collectivité doit rester **recommandée**

Recommande l'**obligation vaccinale pour les professionnels** de santé, et autres professions en établissement de santé ou MS (en contact avec personnes âgées ou à risque de grippe sévère)

- Pas de décret d'application pour l'instant
- Loi de financement
- Mise en place sur 2 années
- 13 octobre 2026 : début de la campagne de vaccination anti grippale

Semaine Occitane de l'antibiorésistance



Semaine Occitane : contre l'antibiorésistance



Semaine Occitane : contre l'antibiorésistance



À l'occasion de la **Semaine mondiale de lutte contre l'antibiorésistance** du **18 au 24 novembre 2026**, lenous vous proposons des actions régionales (CRPV/CPAM) !

Au programme :

**Des supports à
diffuser en amont :**

Une boîte à outils sera disponible !

- *Affiche grand public sur l'antibiorésistance*
- *Affiche professionnels de santé (médecins généralistes, dentistes et pharmaciens)*
- *Affiche pour les établissements de santé et ESMS*



18/11

La semaine



24/11

1 jour 1 message

*Un message par jour
sera diffusé en région*

3 webinaires à destination :

- *de la ville*
- *des EHPAD*
- *des établissements de santé*

**1 action régionale
fédératrice**

*L'Occitanie bouge pour
les antibiotiques*

Référent en Antibiothérapie en ES



Merci pour votre présence et votre participation

